



VINORELBINA ORAL

¿Qué es y para qué se utiliza?

La vinorelbina oral es un agente citostático indicado en el tratamiento de distintas neoplasias, cuando no es posible utilizar la vinorelbina por vía intravenosa.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

NAVELBINE 20MG CAP E/1

NAVELBINE 30MG CAP E/1

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en NEVERA (entre 2 y 8 °C).
Mantener el blister perfectamente cerrado.

¿Cómo se administra?

Se recomienda la administración de vinorelbina con algo de comida. Nunca con zumo de pomelo.

Antes de tomar el fármaco asegúrese que la cápsula no está dañada. En caso que la cápsula esté dañada o alterada, devolver a la farmacia. Si hay contacto con el líquido que contiene lavar la zona minuciosamente con agua o suero fisiológico.

Debe tomar la cápsula con agua sin masticarla, chuparla o disolverla. Si por error ocurriera esto enjuáguese la boca con agua o suero fisiológico y comuníquelo al médico.

Si vomita al cabo de pocas horas de la toma, no debe repetir nunca la administración de la dosis.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son: disminución de los glóbulos rojos, blancos y plaquetas; pérdida de reflejos; náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento y pérdida de apetito; caída del cabello; sensación de cansancio y fiebre.

Avise a su médico o farmacéutico en caso de aparición de alguno de estos síntomas u otros no mencionados.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de vinorelbina cuando se administran conjuntamente, conduciendo a un aumento de los efectos adversos o haciendo que vinorelbina no sea efectiva. Vinorelbina puede producir el mismo efecto a otros medicamentos.

No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Vinorelbina no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento con vinorelbina.

Excipientes de declaración obligatoria

Etanol, sorbitol, propilenglicol, glicerol.

Identificación

Navelbine 20 mg: cápsula blanda marrón claro con la impresión "N20"

Navelbine 30 mg: cápsula blanda rosa con la impresión "N30"



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO