



ESTIRIPENTOL (Diacomit®)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Estiripentol es un medicamento que está indicado en combinación con clobazam y valproato como terapia adyuvante para las convulsiones tónico-clónicas generalizadas refractarias en pacientes con epilepsia mioclónica grave de la infancia (Síndrome de Dravet) cuyas convulsiones no se controlan adecuadamente con clobazam y valproato.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

DIACOMIT 250 mg SOBRES E/60

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C) y en su envase original para protegerlo de la luz.

¿Cómo se administra?

El polvo debe disolverse en un vaso de agua y tomarse inmediatamente después de su disolución. Tras ingerir el medicamento, lavar el vaso con un poco de agua y beberla para asegurar la toma completa de la dosis. Estiripentol debe tomarse SIEMPRE junto con alimentos, ya que se degrada rápidamente en medio ácido (por ejemplo exposición al ácido gástrico en un estómago vacío).

NO DEBE TOMARSE CON: leche o productos lácteos (yogur, queso cremoso, etc.), bebidas carbonatadas, zumos de frutas o alimentos/bebidas que contengan cafeína o teofilina (bebidas de cola, chocolate)

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que falten menos de 12 horas para la próxima. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a Diacomit® destacan:

- Anorexia, pérdida de apetito, pérdida de peso, náuseas, vómitos (especialmente en combinación con valproato sódico)
- Insomnio, agresividad, irritabilidad
- Neutropenia
- Somnolencia, ataxia (descoordinación en los movimientos), hipotonía (disminución del tono muscular), distonía (contracciones musculares involuntarias)

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen estos u otros efectos adversos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de estiripentol cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo.

Consulte a su médico o farmacéutico si está tomando actualmente cualquier otro medicamento, incluido aquellos adquiridos sin receta.

Estiripentol NO DEBE ADMINISTRARSE junto con:

- Alcaloides del cornezuelo del centeno (ergotamina, dihidroergotamina)
- Cisaprida, halofantrina, pimozida, quinidina, bepridil
- Inmunosupresores (tacrolimus, ciclosporina, sirolimus)
- Estatinas (atorvastatina, simvastatina, etc.)

Estiripentol DEBE ADMINISTRARSE CON PRECAUCIÓN junto con:

Midazolam, triazolam, alprazolam, teofilina, cafeína, clorpromazina, otros fármacos antiepilépticos, omeprazol, antihistamínicos, codeína, etc.

Excipientes de declaración obligatoria

Sodio (0,11mg/sobre), Aspartamo, Glucosa líquida pulverizada, Sorbitol.

Identificación

Diacomit® se presenta en forma de polvo cristalino de color rosa pálido para suspensión oral. Este polvo viene acondicionado en sobres fabricados con una película de papel/aluminio/polietileno.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**