



ANAGRELIDA

¿Qué es y para qué se utiliza?

Anagrelida es un agente citostático indicado para la reducción del recuento elevado de plaquetas en pacientes de riesgo con trombocitemia esencial.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

XAGRID Caps 0,5 mg E/100

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.

¿Cómo se administra?

Anagrelida se puede tomar con o sin alimentos, pero siempre del mismo modo y a la misma hora del día. Las cápsulas deben ingerirse con un vaso de agua ENTERAS (NO abrir). Evite el contacto con la piel, y lávese las manos antes y después de cada toma.

NO tome zumo de POMELO durante el tratamiento con anagrelida

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son: alteraciones gastrointestinales (náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y flatulencia), dolor de cabeza, mareo, palpitaciones, taquicardia, erupción cutánea, fatiga, anemia, retención de líquidos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de anagrelida. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Anagrelida no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico.

Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento con anagrelida.

Se recomienda precaución al conducir o utilizar máquinas.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

Cápsulas duras opacas de color blanco con la inscripción 'S 063' impresa.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO