



## CLORAMBUCILO



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Clorambucilo está indicado en el tratamiento de la Enfermedad de Hodgkin, Linfoma no-Hodgkin, leucemia linfocítica crónica y macroglobulinemia de Waldenström.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

LEUKERAN 2 MG COMP E/25

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (2-8°C), en su envase original y protegido de la luz y de la humedad.

### ¿Cómo se administra?

Clorambucilo debe tomarse por vía oral, preferiblemente SIN alimentos, 1 hora antes o 2 horas después de las comidas manteniendo siempre el mismo horario. Los comprimidos han de tragarse preferiblemente enteros. Evite el contacto con la piel. Lávese las manos antes y después de cada toma. Evite las comidas ácidas, picantes o especiadas. Consulte a su farmacéutico en caso de necesitar fraccionar el comprimido.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado una dosis tómela tan pronto como sea posible, a no ser que se encuentre más próxima la siguiente dosis olvidada. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual. Si vomita, únicamente repita la dosis si ha transcurrido menos de media hora desde la toma.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes que pueden aparecer durante la toma de clorambucilo son: dermatológicos (rash cutáneo, prurito, edema), hematológicos (anemia, disminución de los linfocitos y/o de las plaquetas), hepatotoxicidad, efectos gastrointestinales (dolor abdominal, diarrea, anorexia, náuseas, vómitos, estomatitis), neurológicos (mioclonías, neuropatía periférica, debilidad, convulsiones), ataxia, agitación, confusión, fatiga, fiebre, alucinaciones, irritabilidad e hiperactividad.

Consulte a su médico o farmacéutico si aparecen éstos u otros efectos adversos.

### Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto del clorambucilo cuando se administran conjuntamente, dando lugar a un aumento de los efectos adversos o haciendo que no sea efectivo. Asimismo, clorambucilo también puede afectar a la efectividad y efectos adversos de otros medicamentos. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No se recomienda el uso de este medicamento durante el embarazo o la lactancia.

### Excipientes de declaración obligatoria

### Identificación

Leukeran® 2mg se presenta en forma de comprimidos recubiertos. Cada envase contiene 25 comprimidos.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

**PACIENTE:** \_\_\_\_\_

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

### ***Y recuerde.....***

**Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico**

**Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos**

**Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta**

**Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños**

**No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)**

**Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original**

**Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital**

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**