

UNIDAD DE ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES EXTERNOS

Servicio de Farmacia - Hospital Universitario La Fe

INFORMACIÓN DE MEDICAMENTOS

Tel.: +34 961 24 43 76 Correo-e: ufpe_dslafe@gva.es www.ufpelafe.com

ATALURENO



¿Qué es y para qué se utiliza?

Atalureno (Translarna®) está indicado para el tratamiento de la distrofia muscular de Duchenne.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

TRANSLARNA 1000 MG 30 SOBRES TRANSLARNA 125 MEQ/ML 30 SOBRES TRANSLARNA 250 MG 30 SOBRES

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (25 °C).

¿Cómo se administra?

Atalureno se administra por vía oral, en 3 veces al día. La primera toma se debe realizar por la mañana, la segunda al mediodía y la tercera por la noche.

Instrucciones de preparación:

- 1. Coja el número de sobres indicados
- 2. Dé unos golpecitos en la parte inferior del sobre para que se suelte el contenido
- 3. Abra la parte superior del sobre
- 4. Vierta todo el contenido del sobre en un vaso
- 5. Añada como mínimo 30 mL de agua, leche o alimentos semisólidos (como yogur o pudin) y remuévalo durante 30 a 60 segundos
- 6. Ingiera toda la mezcla del recipiente
- 7. Añada algo más del líquido o semisólido, mézclelo y vuelva a ingerirlo de nuevo (repita este paso hasta que no queden gránulos pegados al recipiente)

Se debe administrar cada dosis después de su preparación. Si no se consume, la dosis preparada se debe desechar en las 24 horas siguientes a su preparación si se mantiene en nevera (2 - 8 ℃), o en las 3 h oras siguientes si se mantiene a temperatura ambiente (15 - 30 $^{\circ}$).

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si hay un retraso en la administración de atalureno inferior a 3 horas después de la hora habitual de la dosis de la mañana o mediodía, o de menos de 6 horas después de la de la noche, se deberá tomar la dosis sin realizar cambios en el horario. Si el retraso es mayor, no se tome la dosis y continue con su horario habitual. Nunca se debe tomar una dosis doble o adicional para compensar una dosis olvidada.

¿ Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Las reacciones adversas más frecuentes son: dolor de cabeza, náuseas y vómitos.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de atalureno. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Excipientes de declaración obligatoria

Manitol

Identificación

Sobre de una hoja de aluminio laminada y termosellada



Unidad de Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE) - Hospital La Fe Página 1 de 2 Fecha última revision: 25/04/2017

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

8	\$	10	11	12	13	(15	16	17	18	19	20	22	23	
		9.0	2	2.00				100	14	AS.	Ŧ	7		2,922	
				5686				83	į		E	1		0000	
ORSI	EDVAC	IONES	<u> </u>	:95:				55			£.	13			
ERV/	٩C	IONES	S:												

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO

Atención Farmacéutica a Pacientes Externos (UFPE) - Hospital La Fe ATALURENO

Página 2 de 2