



ATAZANAVIR

¿Qué es y para qué se utiliza?

Atazanavir es un inhibidor de la proteasa que, en combinación con otros medicamentos antirretrovirales, está indicado en el tratamiento de la infección por el VIH.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

REYATAZ 150MG CAPS E/60

REYATAZ 200MG CAPS E/60

REYATAZ 300MG CAPS E/30

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.

¿Cómo se administra?

Las cápsulas deben tragarse enteras (no abrir, masticar o romper las cápsulas) y con un vaso de agua u otra bebida.

Debe tomarlo CON alimentos.

Atazanavir puede asociarse con ritonavir en el tratamiento del VIH. En ese caso, ambos fármacos deben administrarse juntos.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Tómela tan pronto como sea posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a atazanavir se encuentran: cefalea, trastornos gastrointestinales (diarrea), posible aumento de sangrado en pacientes hemofílicos, hiperbilirrubinemia acompañada o no de ictericia (que se pueden manifestar como aparición de tono amarillento de la piel y/o los ojos, orina oscura).

Consulte a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos.

Observaciones

Si usted toma:

- Didanosina (VIDEX®) junto con ATAZANAVIR, deberá tomar didanosina 2 horas antes o 1 hora después de la administración de atazanavir (REYATAZ®).
- Tenofovir (VIREAD®) con ATAZANAVIR, debe tomar todas las dosis con alimentos.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de atazanavir. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Evite la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa
Propilenglicol

Identificación

Atazanavir se presenta como:

REYATAZ® 150MG: cápsula dura opaca de color azul en la que se imprime con tintas blanca y azul en una mitad "BMS 150 mg" y en la otra "3624".



REYATAZ® 200MG: Cápsula dura opaca de color azul en la que se imprime con tinta blanca en una mitad "BMS 200 mg" y en la otra "3631".

REYATAZ® 300MG: Cápsula dura opaca de color rojo y azul en la que se imprime con tinta blanca en una mitad "BMS 300 mg" y en la otra "3622".

ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO