



RILUZOL

¿Qué es y para qué se utiliza?

Riluzol actúa a nivel del sistema nervioso central y está indicado en pacientes con esclerosis lateral amiotrófica.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

RILUTEK 50 mg comp. EN / 56

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente.

¿Cómo se administra?

Riluzol puede tomarse en ayunas o con alimentos, pero NUNCA con comidas grasas porque disminuyen su absorción.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Riluzol se administra normalmente cada 12 h. En caso de que olvide una dosis, tómela tan pronto como sea posible siempre que no hayan pasado 6 horas y continúe con el tratamiento manteniendo el horario habitual.

Si han pasado más de 6 horas desde el olvido: NO tome la dosis olvidada y espere a la próxima toma para continuar con el tratamiento.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Los efectos adversos más frecuentes son cansancio, sensación de mareo, vértigo, cefalea, somnolencia, diarrea, dolor abdominal y alteración de las pruebas hepáticas.

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de riluzol. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

Riluzol puede producir somnolencia, vértigos o mareos, por lo que se recomienda no conducir vehículos ni utilizar máquinas en caso de aparición de dichos síntomas.

Excipientes de declaración obligatoria

Identificación

Comprimidos blancos, con forma de cápsula y con la inscripción "RPR202" en una de las caras.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO