



TELAPREVIR



¿Qué es y para qué se utiliza?

Telaprevir está indicado en el tratamiento de la infección crónica por virus de la hepatitis C (genotipo 1) en combinación con peginterferón y ribavirina.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

INCIVO 375 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS E/42

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente y proteger de la humedad. No retirar la bolsita de desecante del envase.

¿Cómo se administra?

Telaprevir se administra por vía oral. La dosis habitual es de 750 mg (dos comprimidos) tres veces al día. Telaprevir debe tomarse CON alimentos. Tragar los comprimidos enteros.

Tome siempre la dosis indicada por su médico.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis, tómela lo antes posible, excepto si se encuentra más próxima la siguiente dosis que la olvidada.

No tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a telaprevir se encuentran: cansancio y debilidad, mareos, anemia, náuseas, diarrea, vómitos, hemorroides o molestias en el ano. Puede aparecer picor o alteraciones en la piel.

Consulte a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos.

Observaciones

Telaprevir se debe usar siempre en combinación con pegintrón y ribavirina.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de telaprevir. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Las mujeres en edad fértil deben utilizar dos métodos anticonceptivos eficaces durante el tratamiento, evitando el uso de métodos basados en hormonas. Si una paciente quedara embarazada durante el mismo, debe informar inmediatamente a su médico.

Se desconoce si telaprevir puede excretarse por leche materna. Se recomienda interrumpir la lactancia antes de iniciar el tratamiento con telaprevir.

El tratamiento combinado de telaprevir, peginterferón y ribavirina puede influir en la capacidad de conducir. Algunos pacientes pueden experimentar desmayos o alteraciones de la visión durante el tratamiento con telaprevir. No conduzca ni utilice máquinas si experimenta alguno de estos problemas.

Excipientes de declaración obligatoria

Sodio

Identificación

Comprimidos recubiertos con película, ovalados de color amarillo. Frasco de plástico con 42 comprimidos, provisto de un cierre a prueba de niños y un precinto sellado. Se añade un desecante.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO