



ETANERCEPT (BENEPALI)



¿Qué es y para qué se utiliza?

Etanercept es un agente biológico que actúa reduciendo el dolor y la inflamación asociados a ciertas enfermedades autoinmunes como artritis reumatoide, espondilitis anquilosante, artritis psoriásica o psoriasis.

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

BENEPALI JER 50 MG E/4

BENEPALI PLUM 50 MG E/4

¿Cómo se debe conservar?

Conservar en nevera (entre 2°C y 8°C). No congelar.

¿Cómo se administra?

Etanercept se administra por vía subcutánea (bajo la piel). Elija un día fijo de administración y hágalo siempre el mismo día y a la misma hora.

Lávese las manos meticulosamente antes de cada inyección, limpie el sitio de inyección con una toallita de algodón impregnada en alcohol y alterne el lugar en cada administración.

En caso de usar plumas, no pellizque la piel para administrar, debe estirarla suavemente y colocar la pluma en un ángulo de aproximadamente 90 grados con respecto a la piel.

Tras la inyección, presione con un algodón o gasa el sitio de inyección durante unos segundos. NO frote.

Se recomienda sacar de la nevera la jeringa o pluma que vaya a inyectarse al menos 15 minutos antes. Dicha jeringa NUNCA debe reutilizarse.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si se le olvida una dosis, inyéctese tan pronto como lo recuerde, a no ser que la próxima dosis esté más próxima, en cuyo caso deberá omitir la dosis olvidada.

La dosis siguiente se administrará el mismo día que estaba previsto inicialmente (como si no hubiera olvidado una dosis).

Nunca se administre una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Reacción local en el punto de inyección (inflamación, dolor, enrojecimiento, picor). Reacción alérgica (erupción cutánea, ronchas, dificultad para respirar, inflamación cara, manos o pies). Riesgo aumentado de infecciones (que se pueden manifestar con fiebre, heridas, malestar general, problemas dentales, escozor al orinar, tos).

Observaciones

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de etanercept. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Tras un adiestramiento adecuado, la inyección se la podrá administrar usted mismo u otra persona (familiar o amigo). No intente inyectarse hasta que esté seguro de cómo hacerlo.

No se inyecte en un lugar en el que la piel esté enrojecida, tenga un moratón o esté dura.

Algunas vacunas están contraindicadas durante el tratamiento. Consulte con su médico antes de ser vacunado.

Mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Etanercept no debe utilizarse durante el embarazo, si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Las mujeres no deben dar el pecho durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Sacarosa

Identificación

Benepali® contiene plumas/jeringas precargadas de una solución inyectable. La solución es transparente e incolora o de color amarillo.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarlo aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**