



## ABIRATERONA



### ¿Qué es y para qué se utiliza?

Inhibidor enzimático que reduce los niveles de testosterona y otros andrógenos indicado en el tratamiento de distintas neoplasias.

### Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

ZYTIGA 250 mg COMPRIMIDOS 120 comprimidos

### ¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (por debajo de 30°C).

### ¿Cómo se administra?

Los comprimidos deben tragarse enteros, con agua y SIN alimentos (al menos una hora antes o dos horas después de las comidas).

Abiraterona se debe tomar en combinación con prednisona o prednisolona a las dosis recomendadas por su médico.

Tome siempre la dosis prescrita por su médico y nunca la modifique por su cuenta.

### ¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si olvida una dosis de abiraterona, prednisona o prednisolona, debe reanudar el tratamiento al día siguiente con las dosis diaria habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

### ¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a abiraterona se encuentran: aumento de presión arterial, hipopotasemia y retención de líquidos.

La administración de prednisona o prednisolona disminuye la intensidad estos efectos adversos.

Abiraterona puede producir un aumento en la incidencia de infecciones urinarias.

Consulte a su médico o farmacéutico si presenta alguno de estos efectos adversos.

### Observaciones

Muchos medicamentos de uso habitual pueden interaccionar o interferir con el efecto de abiraterona. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

Se desconoce si la abiraterona o sus metabolitos están presentes en el semen. Si el paciente mantiene relaciones sexuales con una mujer en edad fértil o embarazada, debe utilizar preservativo conjuntamente con otro método anticonceptivo eficaz.

### Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Sodio

### Identificación

Abiraterona se presenta en forma de comprimidos ovalados blancos o casi blancos, grabados con AA250 en una cara.

Frascos blancos redondos con tapón de polipropileno que contienen 120 comprimidos.



## ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: \_\_\_\_\_

	8	10	11	12	13	15	16	17	18	19	20	22	23

OBSERVACIONES:

---



---



---



---

### Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO  
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**