



RILPIVIRINA



¿Qué es y para qué se utiliza?

Rilpivirina, en combinación con otros medicamentos antirretrovirales, está indicado para el tratamiento de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana de tipo 1 (VIH-1)

Nombres y presentaciones comerciales disponibles en nuestro hospital

EDURANT 25mg COMP E/30

¿Cómo se debe conservar?

Conservar a temperatura ambiente (inferior a 30°C) y en su envase original para protegerlo de la luz y de la humedad.

¿Cómo se administra?

Debe tomar los comprimidos de rilpivirina enteros (sin partir), con un vaso de agua y SIEMPRE CON ALIMENTOS. No mastique ni machaque los comprimidos.

Si vomita dentro de las 4 horas desde la toma de rilpivirina, debe tomar otro comprimido con una comida. Si vomita pasadas más de 4 horas después de la toma, no es necesario que tome otra dosis hasta la próxima.

¿Qué hacer si se olvida una dosis?

Si ha olvidado tomar una dosis tómela tan pronto como sea posible con alimentos, a no ser que falten menos de 12 horas para la próxima toma. En este caso, no tome la dosis olvidada y espere a la siguiente dosis a la hora habitual.

Nunca tome una dosis doble para compensar un olvido.

¿Qué efectos adversos pueden aparecer durante el tratamiento?

Entre los efectos adversos más frecuentes asociados a rilpivirina destacan: náuseas y diarrea, erupciones en la piel, mareos, dolores de cabeza, fatiga, insomnio y pesadillas.

Observaciones

El éxito del tratamiento depende de su correcto cumplimiento. No deje de tomar su medicación sin avisar a su médico. El tratamiento antirretroviral no ha demostrado disminuir el riesgo de contagio del virus a otras personas, por lo que éstas deben tomar las medidas de prevención adecuadas.

Ciertos medicamentos pueden interferir con el efecto de rilpivirina. No tome ningún otro medicamento, suplemento dietético o producto natural sin consultar antes con su médico o farmacéutico.

No se debe administrar rilpivirina junto a:

- inhibidores de la bomba de protones, como omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol y rabeprazol
- antiepilépticos como carbamacepina, oxcarbacepina, fenobarbital y fenitoína
- antimicrobianos como rifabutina, rifampicina y rifapentina
- el glucocorticoide sistémico, dexametasona, excepto como tratamiento de dosis única
- hierba de San Juan o Hipérico (*Hypericum perforatum*)
- zumo de pomelo

Las mujeres en edad fértil deben utilizar un método anticonceptivo eficaz durante el tratamiento. Si quedara embarazada durante el tratamiento informe inmediatamente a su médico. Se debe evitar la lactancia materna durante el tratamiento.

Excipientes de declaración obligatoria

Lactosa

Identificación

EDURANT® se presenta en forma de comprimido recubierto con película de color blanco a blanquecino, redondo, biconvexo con un diámetro de 6,4 mm, grabado en un lado del comprimido con la inscripción "TMC" y "25" en el otro lado.



ESQUEMA INDIVIDUALIZADO DE ADMINISTRACIÓN

PACIENTE: _____

																	
	8		10	11	12	13		15	16	17	18	19	20		22	23	

OBSERVACIONES:

Y recuerde.....

Tome su medicamento exactamente como le ha indicado su médico

Este medicamento se le ha prescrito a usted personalmente y no debe ser utilizado por otras personas ya que puede perjudicarle aunque tenga síntomas similares a los suyos

Informe a su médico o farmacéutico si está tomando o ha tomado recientemente otros medicamentos, incluso los adquiridos sin receta

Mantenga sus medicamentos fuera de la vista y del alcance de los niños

No utilice su medicamento una vez superada su fecha de caducidad (el último día del mes indicado en el envase)

Conserve sus medicamentos, siempre que sea posible, en su envase original

Devuelva la medicación no utilizada a la farmacia del hospital

**ESTA INFORMACIÓN NO SUSTITUYE AL PROSPECTO
CONSULTE A SU MÉDICO O FARMACÉUTICO**